

Vincent Wong

TOMADA DE DECISÃO NA PRÁTICA ESTÉTICA

Os Procedimentos corretos
para cada Paciente

 NAPOLEÃO EDITORA

 QUINTESSENCE PUBLISHING



Conteúdo

Prefácio	vii
Agradecimentos	ix
Colaboradores	xi
1. A Consulta Cosmética	1
<i>Chris Gill e Vincent Wong</i>	
2. A Pele	11
<i>Sue Ann Chan, Sarah Whitehead, Darika de Bacq Rose, Alexander Parys, e Vincent Wong</i>	
3. A Fronte	39
<i>Vincent Wong</i>	
4. A Região Periorbital	49
<i>Vincent Wong</i>	
5. O Nariz	67
<i>Vincent Wong</i>	
6. As Bochechas	77
<i>Vincent Wong</i>	
7. A Região Perioral	89
<i>Vincent Wong</i>	
8. O Mento	105
<i>Vincent Wong</i>	
9. A Linha da Mandíbula e o Pescoço	115
<i>Vincent Wong</i>	
10. O Couro Cabeludo	131
<i>Kelly Morrell, Naomi O'Hara Collins, e Vincent Wong</i>	
11. Equilibrando Abordagens Clínicas Cirúrgicas e Não Cirúrgicas	145
<i>Mehmet Veli Karaaltin, Adnan Erdem, e Vincent Wong</i>	

Questionário de Interesse Estético

Data: _____

Nome do paciente: _____

Data de nascimento: _____

Qual é o principal motivo da sua visita hoje?

Gostaria de ser aconselhado sobre:

- Como posso parecer melhor para a minha idade
- Como posso mudar algo que vem me incomodando há anos
- Como posso parecer mais atraente
- Outros: _____

Você já foi a uma consulta ou fez tratamento para um procedimento cosmético antes?

- Sim Não

Com que frequência você pensa em querer um procedimento cosmético?

- Na maioria dos dias Semanalmente Mensalmente

Quais das três afirmações melhor refletem como você gostaria de se sentir ou parecer após o tratamento?

- Quero parecer menos cansado
- Quero parecer menos irritado
- Quero parecer menos triste

- Quero uma aparência menos flácida
- Quero parecer mais jovem
- Quero parecer mais atraente

- Quero que meu rosto pareça mais magro
- Quero características mais suaves

Por favor, circule a(s) área(s) de seu interesse:



Imagens cortesia de Allergan.




FIGURA 1.1 Questionário de interesse estético. (©2021 Allergan; usado com permissão; todos os direitos reservados.)

(Continua)

Como você avalia a qualidade da sua pele?
(Por favor, circule a resposta apropriada)

Baixa Razoável Boa Muito boa Excelente

Se você pudesse melhorar um aspecto da sua pele, o que você melhoraria?
(Por favor, circule a resposta apropriada)

Hidratação Elasticidade Suavidade Cor

Estes tratamentos/produtos me interessam:
(Por favor, circule a(s) área(s) de tratamento que lhe interessam)

MELHORIA DA PELE	MELHORIA FACIAL	CONTORNO DO CORPO	OUTRO
Injetáveis para a pele	Preenchimentos faciais	Redução de gordura	Depilação a laser
Produtos para a pele	Relaxantes de rugas	Aumento do peito	Substituição de cabelo
Tratamento a laser	<i>Lifting</i> facial	Correção de mama	Depilação
<i>Peeling</i>	Correção de orelha	Abdominoplastia	Labioplastia
Microdermoabrasão	Redução de gordura	Elevação do braço	Revisão da cicatriz
Facial	Cirurgia nasal	Aumento de nádegas	
Tonificação da pele	Correção da pálpebra		
	Correção de sobrancelha		

Como você ficou sabendo sobre nós?

- Meu médico
 Minha companhia de seguros
 Anúncios/jornais
 Um amigo ou familiar

- Ferramenta de busca
 Plataforma de mídia social
 Seminário
 Outro

Informações de Contato

- Gostaria de receber informações sobre novos produtos/tendências/nossa clínica
 Você tem permissão para entrar em contato comigo para mais perguntas sobre uma consulta em sua clínica

Número de telefone: _____

Endereço de e-mail: _____

Assinatura: _____

Preparado por Allergan, janeiro de 2017, INT/0318/2016(1)

FIGURA 1.1 Questionário de interesse estético. (Continuação)



FIGURA 5.7 Paciente: superior e inferior.

- Infecção (falta de técnica asséptica).
- Efeito Tyndall (injeções superficiais).

Estudo de Caso 5.1

Idade do paciente: 47

Sexo: Feminino

Queixa apresentada: Rotação da ponta do nariz para baixo. Paciente também busca melhora do ângulo nasofrontal.

Classificação (antes)

- Rotação da ponta do nariz: 4 (rotação para baixo severa).
- Projeção da ponta do nariz: 0 (mínimo) (Figura 5.7).

Plano de Tratamento

- Tratamento de preenchimento dérmico usando Definisce Restore da Relife (1ml usado no total) (Figura 5.8).

Classificação (depois)

- Rotação da ponta do nariz: 2 (horizontal).
- Projeção da ponta do nariz: 1 (levemente projetada).




FIGURA 5.8 Linha reta, técnica linear retrógrada; círculo, técnica de bólus.



FIGURA 5.9 Paciente: superior e inferior.




FIGURA 6.1 Estruturas das bochechas: A, artéria facial; B, nervo facial, ramos zigomáticos; C, músculo orbicular do olho, parte orbital; D, veia facial; E, músculo elevador do lábio superior; F, músculo zigomático menor; G, músculo zigomático maior; H, músculo elevador do lábio superior e asa do nariz; I, nervo facial, ramos bucais superiores. (Adaptado de www.anatomy.tv com permissão © Informa UK Ltd [comercializado por Primal Pictures], 2021.)




FIGURA 6.2 (a) Compartimentos superficiais de gordura da bochecha: a, gordura infraorbitária; b, gordura da bochecha medial; c, gordura nasolabial; d, gordura média da bochecha; e, gordura lateral da bochecha; f, gordura *jowl* superior; g, gordura *jowl* inferior. (b) Compartimentos de gordura da bochecha profunda: A, gordura suborbicular medial do olho; B, gordura suborbicular lateral do olho; C, gordura medial profunda da bochecha; D, gordura bucal. (Adaptado de Fundarò S, Mauro G, Di Blasio A, et al. [2018] Anatomy and aging of cheek fat compartments, *Med Dent Res.* 2: DOI: 10.15761/MDR.1000111 na Open Access.)



(c)

FIGURA 6.2 (c) Compartimentos de gordura da bochecha superficial e profundo em relação um ao outro. (Continuação)




FIGURA 6.3 Localização do sulco médio da bochecha.



FIGURA 6.4 Escala de severidade do sulco da bochecha. 0 = bochechas cheias, 1 = bochechas levemente afundadas, 2 = bochechas moderadamente afundadas, 3 = bochechas severamente afundadas, 4 = bochechas muito afundadas (segundo a escala da Merz Aesthetics).



FIGURA 7.7 Escala de severidade de linhas de marionete. 0 = sem linhas, 1 = linhas leves, 2 = linhas moderadas, 3 = linhas graves, 4 = linhas muito graves (segundo a escala da Merz Aesthetics).

Linhas de Marionete

Comumente conhecidas como ‘bigode chinês’, as linhas de marionete (dobra melomental) se estendem dos cantos da boca até a borda da mandíbula. Muitas vezes, as linhas de marionete são o resultado da perda de volume e da contração do músculo depressor do ângulo da boca (DAB). Em muitos casos, as linhas de marionete são combinadas com uma depressão triangular abaixo da comissura oral, dando ao paciente um ‘olhar triste’.

Escala de Pontuação

As linhas de marionete podem ser classificadas de acordo com a escala da Figura 7.7.

Opções de Tratamento

- Preenchimento dérmico

Preenchimento dérmico moderadamente reticulado pode ser injetado nesta região para restaurar o volume. Isso pode ser feito usando uma agulha de 27G ou uma cânula de 25G. Dependendo da severidade, pode ser necessária uma mistura de injeções profundas (nível subcutâneo) e superficiais (derme profunda). As injeções de preenchimento dérmico devem ser sempre no meio da prega e medialmente para cobrir a depressão triangular abaixo da comissura oral [6].

- Neurotoxina

Em pacientes com aumento do tônus DAB, a injeção de neurotoxina pode ajudar a corrigir a queda dos cantos da boca. Em média, são necessárias 2 a 3 unidades de neurotoxina por lado. Ao injetar o DAB, é importante ter o local da injeção lateral à linha da marionete, na linha da mandíbula, com a injeção sendo colocada profundamente no músculo. Isso evitará a injeção acidental no músculo circundante, especialmente no depressor do ângulo inferior [4].

Tratamentos Combinados

- Neurotoxina e preenchimento dérmico.
- Realce dos lábios.
- Revolumização da face média.
- Reposicionamento do tecido da face média com fios.
- Realce do maxilar com preenchimento dérmico.

Complicações

- Edema (por trauma da agulha).
- Contusão (por trauma da agulha).
- Comprometimento vascular (de injeções de preenchimento dérmico).
- Necrose (de injeções de preenchimento dérmico bloqueando uma artéria).

- Incapacidade de sorrir/sorriso assimétrico (da injeção de neurotoxina no músculo errado).
- Infecção (por falta de técnica asséptica).

Estudo de Caso 7.1

Idade do paciente: 24

Sexo: Feminino

Queixa Apresentada

- Sorriso gengival e volume labial. A paciente não deseja receber tratamento com neurotoxina.

Classificação (antes)

- *Preenchimento labial:* 1 (fino) (Figura 7.8).

Plano de Tratamento

- Preenchimento dérmico usando Defínisse Restore da Relife para os lábios (1 ml usado no total) (Figura 7.9).

Classificação (depois)

- *Preenchimento labial:* 3 (grosso) e eliminação do sorriso gengival.



FIGURA 7.8 Paciente: superior e inferior.



FIGURA 7.9 Linhas retas, técnica linear retrógrada.

Estudo de Caso 7.2

Idade do paciente: 56

Sexo: Feminino

Queixa Apresentada

- Volume labial e dobras de marionete.

Classificação (antes)

- *Preenchimento labial:* 0 (muito fino).
- *Dobra de marionete:* 3 (grave) (Figura 7.10).

Plano de Tratamento

- *Sessão 1:* Preenchimento dérmico usando Defínisse Restore da Relife para lábios (1 ml usado no total) (Figura 7.11).
- *Sessão 2:* Preenchimento dérmico usando Defínisse Core da Relife para dobras de marionete (1 ml usado no total) (Figura 7.12).

Classificação (depois)

- *Preenchimento labial:* 2 (moderadamente grosso).
- *Dobra de marionete:* 1 (leve).



FIGURA 7.10 Paciente: superior e inferior.



FIGURA 7.11 Linhas retas, técnica linear retrógrada.



FIGURA 7.12 Linhas retas, técnica linear retrógrada.

Estudo de Caso 7.3

Idade do paciente: 70

Sexo: Feminino

Queixa Apresentada

- Sulco nasolabial, volume labial, linhas periorais e linhas de marionete.

Classificação (antes)

- *Preenchimento labial:* 0 (muito fino).
- *Linha de marionete:* 4 (muito grave).
- *Sulco nasolabial:* 4 (muito grave).
- *Linhas periorais:* 4 (muito grave) (Figura 7.13).

Plano de Tratamento

- *Sessão 1:* Preenchimento dérmico usando Definisce Restore da Relife para lábios e filtro solar (1 ml usado no total) e Definisce Core para bochechas, sulcos nasolabiais e linhas de marionete (6 ml usados no total) (Figura 7.14).
- *Sessão 2:* Toxina botulínica usando Botox da Allergan para linhas periorais (8 unidades usadas no total) (Figura 7.15).
- *Sessão 3:* Fios usando os fios Definisce Free Floating da Relife para reposicionar o tecido mole na área da bochecha (três fios usados por lado, seis fios no total) (Figura 7.16).
- *Sessão 4:* *Peeling* de pele usando Definisce Classic Peel (Figura 7.17).